

# โรคพิษสุนัขบ้า

## อันตราย! แต่ป้องกันได้



โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาท จากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่สุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น



ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มี ยารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน

### อาการที่พบในคนหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า



เบื่ออาหาร เจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย มีอาการคัน รุนแรงบริเวณที่ถูกกัด



กระสับ กระส่าย กลัวแสง กลัวลม ไม่ชอบเสียงดัง เพ้อเจ้อ



แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิต

### อาการที่พบในสุนัขหลังจากติดเชื้อพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

สุนัขจะมีอารมณ์และนิสัย เปลี่ยนไปจากเดิม



ระยะที่ ๒

มีอาการที่ทางประสาท คลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง



ระยะที่ ๓

มีอาการทางคอก น้ำลายไหล ขาอ่อน ทรงตัวไม่ได้ล้มลง อัมพาตทั้งตัวอย่างรวดเร็ว และตายในที่สุด



คำแนะนำสำหรับคนเลี้ยงสุนัข

1. คุณก่าฉีดวัคซีนให้สุนัขตามกำหนด
2. ไม่ปล่อยสุนัขในที่สาธารณะ
3. นำสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี

นำสุนัขไปรับการฉีดวัคซีนได้ที่ อปท. ทั่วประเทศ



### ขั้นตอนการป้องกันการติดเชื้อในคน

พาส์ตัวเลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



หลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกสัตว์กัด ทำร้าย



หลังโดนกัด รีบไปพบแพทย์ทันทีเพื่อเข้ารับการรักษา



รับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. ใกล้บ้าน





# โรคพิษสุนัขบ้า



กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อของโรค

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด



ข่วน



เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย

เบื่ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย



ตัวอย่างไวรัสตัวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก

- บิเปลี่ยน ไม่แรง
- หงุดหงิด เกือบตัว
- หวาดระแวง บ่นตายง่าย

ระยะตื่นเต้น

- กระวนกระวาย
- กัดไม่เลือก
- เห่าหอน

ระยะอัมพาต

- บ้าลายไหล
- คางห้อยตก
- ล้มลง ตาย

เกิดจากเชื้อ เรบีส์ไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

**ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%**


การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว

เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง มาตามนัดทุกครั้ง

**\*\*\*คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง\*\*\***



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คุณก่าเน็ด

๑. อย่าเหยย

คาถา ๕ ย กั้นสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ

๒. อย่าเหยียบ



หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ

๓. อย่าแยก



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ เป่า

๔. อย่าหยิบ



อาหารที่สุนัขกำลังกิน

๕. อย่ายุ่ง



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค